

# Erkrankungen des Urogenitaltraktes

Dr. Abidin Geles

Copyright - All Rights Reserved: This document and all other data on the homepage are not to publish or reproduce without the permission of the author Dr. Abidin Geles.

[www.medwissen.ch](http://www.medwissen.ch)

[abidin.geles@gmail.com](mailto:abidin.geles@gmail.com)

**Kontraindikationen für einen Blasenkatheter:**

- Asymptomatische chronische Harnretention
- Urinmonitoring oder Bilanzierung, wenn Gewichtskontrolle möglich ist
- Intensivpflegebedürftigkeit
- Inkontinenz
- Immobilisation, solange Alternativmethoden möglich sind
- Reine Komfortlösung außer bei Palliation

**Indikationen für einen Blasenkatheter:**

- Harnverhalt:
  - Akuter Harnverhalt
  - Symptomatische chronische Ausflussobstruktion und 300 ml Restharn
- Urinmonitoring / Bilanzierung
  - In regelmässigen kurzen Intervallen und direkte therapeutische Konsequenzen aus der Bilanzierung
- Operationen
  - Lange Operationen (>4 Stunden)
  - Perioperativ: aus operationstechnischen Gründen
  - Urogenitalchirurgie und / oder Beckenbodenchirurgie
  - Epidurale / peridurale Anästhesie / Analgesie
- Dekubitalulcera und Inkontinenz

- Dekubitus Grad III oder IV oder Hauttransplantate sacral / perineal und Inkontinenz
- Prolongierte Immobilisation
  - Aus medizinischen Gründen, nach Ausschöpfung aller Alternativen zur kontrollierten Urinableitung, insbesondere zur Schmerzreduktion
- Palliation und Komfort:
  - Terminal-palliative Situation und Störung der Blasenfunktion und /oder Schwierigkeiten einer normalen Miktion
  - Bei hohem Leidensdruck und auf Wunsch des informierten Patienten

Die Indikation für einen Harnkatheter muss täglich evaluiert werden, wenn keine Indikation besteht, muss der Katheter gleich entfernt werden.

### **Vorsorgeuntersuchungen bei Gebärmutterhalskrebs**

Da Gebärmutterhalskrebs durch HPV-Viren verursacht wird, würde eine Vorsorgeuntersuchung mit PAP-Abstrich (erkennt Krebszellen oder Vorstufen) oder HPV-Test (erkennt krebsbegünstigende Viren). Ab 21. LJ Abstrich alle 3 Jahre, und ab dem 30 LJ Abstrich oder HPV-Test alle 3 Jahre durchführen lassen.

Bei Fragen / Feedback bitte E-Mail an [abidin.geles@gmail.com](mailto:abidin.geles@gmail.com)

DANKE

Abidin Geles

[www.medwissen.ch](http://www.medwissen.ch)