

Motilitätsstörungen des Ösophagus

Dr. Abidin Geles

Copyright - All Rights Reserved: This document and all other data on the homepage are not to publish or reproduce without the permission of the author Dr. Abidin Geles.

www.medwissen.ch

abidin.geles@gmail.com

Motilitätsstörungen des Ösophagus

(Engl. Esophageal motility disorder)

Achalasie

Definition und Symptome:

- Kongenitale Störung des vegetativen Plexus am Ösophagus
- Aganglionäres Segment am ösophagogastralen Übergang, in dem die Ringmuskulatur in einer dauernden „Verschluss“-Stellung, überlagert von starken Kontraktionen fixiert ist; zervikale peristaltische Welle endet hier.
- 20-30 Lebensjahr, stressabhängiger Dysphagie → später Dauersymptom, feste Nahrung besser passierbar, Nachtrinken hilft, schmerzhaft, prästenotische Ösophagusdilatation, Gewichtsabnahme, Aspiration, Blutung

Symptome

- Dysphagie
- Globusgefühl
- Regurgitation
- Husten
- Megaösophagus

Diagnose:

- Schluckaktröntgen
- Endoskopie
- Ösophagus-Manometrie

Therapie:

- Bougierung (Vernarbungsgefahr)
- Chirurgie (Linksthorakotomie
 - o Längsspaltung der dysfunktionellen, meist hypertrophen glatten Ringmuskulatur bis kaudal an Fibrae obliquae der Kardia (Myotomie nach Heller), Schleimhautzylinder auf ca. 8-10 cm freigelegt und so belassen, Muskelbiopsie)

Bei Fragen / Feedback bitte E-Mail an abidin.geles@gmail.com

DANKE

Abidin Geles

www.medwissen.ch