

# Peritonitis

Dr. Abidin Geles

Copyright - All Rights Reserved: This document and all other data on the homepage are not to publish or reproduce without the permission of the author Dr. Abidin Geles.

## Definition

Die Peritonitis ist eine Entzündung des Bauchfells. Es wird eingeteilt in:

- Primäre Peritonitis entsteht ohne eine abdominelle Erkrankung z.B. durch eine bakterielle Peritonitis vom Aszites.
- Sekundäre Peritonitis entsteht durch eine abdominelle Erkrankung (Perforation eines Hohlorgans), welche immer eine operative Therapie mit Infektfokus-Aufräumung und Spülung bedarf. Desweiteren muss eine antibiotische Therapie sowie Intensivtherapie eingeleitet werden.

## Einteilung nach Verlauf

- Akute
- Chronische

## Einteilung nach Lokalisation

- Lokalisierte Peritonitis z.B. durch eine perforierte Appendicitis
- Generalisierte Peritonitis z.B. Akutes Abdomen mit paralytischem Ileus

## Symptome

- Schmerzen
- Abwehrspannung
- Harte Bauchdecke

- Ödeme
- Fieber
- Schüttelfrost
- Sepsis

### **Klassifikation nach Hinchey**

- 0: Subseröse Entzündung der Darmwand
- 1: Kleine pericoliche Abszesse/Phlegmone
- 2: Pericoliche Abszesse durchbrechen das Mesenterium
- 3: Freie Perforation mit generalisiertem Eiter
- 4: Generalisierter kotiger Peritonitis mit Sepsis

### **Therapie**

- Antibiotika
- Infusionen
- Operation: Ausschaltung der Entzündungsquelle, Lavage und Entfernung vom toxischen Material und Drainage. Bei Verdacht auf sekundäre Peritonitis Laparotomie (diagnostisch oder explorativ) und Lavage.

Bei Fragen / Feedback bitte E-Mail an [abidin.geles@gmail.com](mailto:abidin.geles@gmail.com)  
DANKE