

# Rektum und Anus

Dr. Abidin Geles

Copyright - All Rights Reserved: This document and all other data on the homepage are not to publish or reproduce without the permission of the author Dr. Abidin Geles.

[www.medwissen.ch](http://www.medwissen.ch)

[abidin.geles@gmail.com](mailto:abidin.geles@gmail.com)

- **Rectum (Mastdarm, Intestinum rectum):** Rectum ist der Abschnitt des Dickdarms zwischen Colon sigmoideum und Anus. Es dient der Speicherung und zeitlich steuerbaren Entleerung der Defäkation.
  - o Rectum ist 12-15 cm lang bei Erwachsenen
  - o Es befindet sich in Höhe des Os sacrum mit Flexura sacralis und Flexura perinalis und mündet in den After
  - o Großteil davon ist extraperitoneal, nur ein kleiner Teil ist intraperitoneal.
  - o Es hat zahlreiche Falten im Inneren (Plicae transversales recti).
  - o Ampulla recti geht an der Junctio anorectalis in den Analkanal mit dem Schließapparat über.
  - o Umschlagsfalte zwischen Rectum und Harnblase beim Mann heißt Excavatio rectovesicalis, bei der Frau gibt es dort 2 Umschlagsfalten die Excavatio rectouterina und Excavatio vesicouterina.
- **Analkanal**
  - o Beginnend vom Oberrand Musculus sphinkter ani internus (bei Anorektalring) bis zum anokutanen Übergang (Linea anocutanea), wo Anoderm in die äußere perianale Haut übergeht
  - o Bei Männer 4.5 cm
  - o Bei Frauen 4 cm
- **Analrand**
  - o Bereich von der Linea anocutanea bis 5 cm distal derselben
  - o Perineale Haut mit verhorntem Plattenepithel und Schweiß- und Talgdrüsen
- **Anus (After):** Die Ausscheidungsöffnung für Defäkation.

Bei Fragen / Feedback bitte E-Mail an [abidin.geles@gmail.com](mailto:abidin.geles@gmail.com)

DANKE

Abidin Geles

[www.medwissen.ch](http://www.medwissen.ch)